医考百晓生

2027年口腔解剖生理学第一节课

速记

1.鱼类：同形牙、多牙列、端生牙

2.爬行类：同形牙、多牙列、侧生牙

3.哺乳类/人类：异形牙、双牙列、槽生牙

4.牙数：由多变少

5.牙形：同形牙 → 异形牙

6.牙列：多牙列 → 双牙列

7.附着方式：端生牙 → 侧生牙 → 槽生牙

8.牙根：无→有

9.分布：广泛 → 集中

10. 以牙颈为界的是：解剖牙冠、解剖牙根

11. 以龈缘为界：临床牙冠、临床牙根

12. 被牙釉质覆盖的部分：解剖牙冠

13. 显露于口腔：临床牙冠

14. 牙龈萎缩：临床牙冠变长

15. 重度磨耗：解剖牙冠变短

16. 牙骨质覆盖的部分：解剖牙根

17. 口腔内不能看见，以龈缘为界：临床牙根

18. 解剖牙冠与牙根交界处的弧形曲线：牙颈

19. 恒牙釉质厚度：切牙切缘 2mm；磨牙牙尖 2.5mm（最厚处）

20. 乳牙釉质厚度：0.5~1.0mm

21. 乳牙萌出时间：6 个月→2.5 岁

22. 乳牙列：2.5-6 岁

23. 替牙列：6-13 岁

24. 恒牙萌出时间：6 岁→13 岁

25. 前磨牙功能：捣碎

26. 部位记录法（最常用）：恒牙→数字 1~8；乳牙→罗马数字 I~V

27. Palmer 记录系统：恒牙→同部位记录法；乳牙→字母 A~E

28. 通用编号系统：恒牙→阿拉伯数字 1~32；乳牙→英文字母 A~T

29. 国际牙科联合会系统(FDI)：恒牙→1/2/3/4；乳牙→5/6/7/8

30. 乳牙牙胚的发生时间是：胚胎 2 个月

31. 乳牙牙胚开始钙化的时间是：胚胎 5-6 个月

32. 乳牙的萌出顺序是：Ⅰ Ⅱ Ⅳ ⅢⅤ

33. 恒 6 牙胚的发生时间是：胚胎 4 个月

34. 恒 8 牙胚的发生时间是：4-5 岁

35. 恒牙开始萌出的时间：6 岁

36. 恒牙的萌出顺序是：上颌：6124357 或 6124537

37. 上、下颌后牙发生咬合接触的面：𬌗面

38. 相邻牙邻面互相接触的区域：接触区

39. 平分颅面部为左右两等份的一条假想线：中线

40. 沿冠根方向通过牙体中心的一条假想线：牙体长轴

41. 两个相邻牙面相交：线角

42. 三个相邻牙面相交：点角

43. 突起部分：牙尖、舌隆突、结节、嵴

44. 凹陷部分：窝、发育沟、裂、点隙

45. 牙尖：近似锥体形、突出成尖

46. 结节：釉质过度钙化

47. 舌隆突：前牙舌面近颈 1/3 处半月形隆突，是前牙的重要解剖特征之一

48. 嵴：釉质长线状隆起

49. 轴嵴：牙尖→颈部

50. 牙尖嵴：牙尖→近远中

51. 三角嵴：牙尖→𬌗面

52. 横嵴：下 4

53. 斜嵴：上 6

54. 边缘嵴：前牙舌窝近远中，后牙𬌗面

55. 颈嵴：颈缘部位微突，位于唇颊面颈 1/3

56. 切峭：切牙切端舌侧长条形的釉质隆起

57. 窝：牙面不规则凹陷

58. 沟：细长型、似山间溪流

59. 发育沟：生长叶融合处,规则走向

60. 副沟：发育沟以外的不规则小沟

61. 裂：钙化不全的沟（更易发生龋坏）

62. 点隙：三条及以上发育沟交汇处或发育沟末端的点状凹陷

63. 生长叶：牙齿的发育钙化中心

64. 斜面：组成牙尖的各个面，每个牙尖有 4 个斜面

65. 全口牙中体积最小：下 1

66. 切牙中体积最大，近远中径最宽：上 1