医考百晓生

2027 年口腔解剖生理学第四节课

速记

1.向前的建𬌗　动力：咀嚼肌（颞、咬、翼内外）、舌肌

2.向后的建𬌗　动力：唇、颊肌

3.乳牙𬌗　期的时间：2.5-6 岁

4.4 岁前特点：无间隙、无磨耗、末端平齐（上下乳Ⅴ）

5.4-6 岁特点：出现灵长间隙（上乳 3 近中/下乳 3 远中）、有磨耗、下乳 5 移至上乳 5 近中

6.替牙𬌗　期的时间：6-12 岁

7.替牙𬌗　期特点：系带低、上 1 有间隙、上 12 牙冠偏远中、暂时性拥挤、暂时性远中𬌗、暂时性深覆𬌗

8.早期恒牙𬌗 ：12-18 岁

9.有最广泛紧密的咬合接触，属于牙对牙的关系是：牙尖交错𬌗

10. 在 ICO 时，其他牙都保持着一对二的接触关系，除了：下 1、上 8

11. 上牙盖过下牙的水平距离：覆盖（超颌）

12. 正常值：1-3mm（含 3mm）

13. Ⅰ度：3-5mm

14. Ⅱ度：5-7mm

15. Ⅲ度：>7mm

16. 上牙盖过下牙的垂直距离：覆合

17. 正常值：切 1/3 内

18. Ⅰ度：中 1/3

19. Ⅱ度：颈 1/3

20. Ⅲ度：超过颈 1/3（达牙龈）

21. 切道斜度与覆𬌗呈　：正比（百老师记忆：正颌手术）

22. 切道斜度与覆盖呈：反比（百老师记忆：盖饭）

23. ICO 时，上下牙以切缘相对，或以颊尖相对称：对刃𬌗

24. ICO 时，上下牙列部分前牙甚至前磨牙均不接触称：开𬌗

25. ICO 时，上后牙的舌尖咬在下后牙颊尖的颊侧称：锁𬌗

26. ICO 时，下后牙的舌尖咬在上后牙颊尖的颊侧称：反锁𬌗

27. 判定𬌗类型的标志：　上、下颌第一恒磨牙的𬌗关系

28. 上 6 的近中颊尖正对下 6 的颊沟为：中性𬌗

29. 上 6 的近中颊尖正对下 6 的颊沟的远中为：近中𬌗

30. 上 6 的近中颊尖正对下 6 的颊沟的近中为：远中𬌗

31. 与水平面平行，（交角 0°）的是：眶耳平面

32. 与𬌗　平面平行的是：鼻翼耳屏线

33. 鼻翼耳屏线与眶耳平面夹角：15°

34. Balkwill 角：26°

35. Bonwill 三角边长：10.16cm

36. Monson 球面半径：10.16cm

37. 全牙列最大接触位：牙尖交错位

38. 部分后牙接触位：后退接触位

39. 无咬合接触的休息位：下颌姿势位

40. 牙的位置指：牙尖交错𬌗 (ICO)

41. 此时下颌骨处于正中，又叫：正中𬌗

42. 下颌骨的位置指：牙尖交错位(ICP)

43. 此时下颌骨处于正中，又叫：正中𬌗位

44. 牙尖交错位正常的意义：是下颌的主要功能位

45. 牙尖交错位正常的特点：咀嚼肌力闭合道终点，下颌运动轨迹的终点

46. 从 ICP 向后退 1mm，下颌骨的位置：后退接触位(RCP)

47. 生理意义：可作单纯铰链开口、前伸和侧向运动

48. 牙的接触，又称：后退接触骀

49. 能做铰链运动的位置：后退接触位和正中关系位

50. 吞咽活动常到达的主要颌位：后退接触位

51. 后退接触位和正中关系位髁突均位于：最上、前位

52. 从 RCP 自如直向前滑 1mm 达到 ICP：长正中

53. 长正中生理性偏斜不超过：0.5mm

54. 头直立,不咀嚼、不吞咽、不说话,上下牙不接触:下颌姿势位(MPP)

55. 息止颌间隙为：2-4mm 或 1-3mm

56. 肌肉处于：最小收缩状态

57. 临床应用：牙列缺失确定垂直距离

58. 从 MPP 开始，下颌向上运动 1-3mm 通过肌肉自主收缩达到咬合接触：肌接触位(MCP)

59. 与牙尖交错位(ICP)的咬合状态：一致